

ЗАВОД СИКМО

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

PLEX[®]

Общество с ограниченной ответственностью «СИКМО»
ИНН 5003088980, КПП 773101001, ОГРН 1105003006217, ОКПО 68156985
Телефон: 8 (495) 477-44-03, e-mail: info@sikmo.ru, www.плекс.рф
Юридический адрес: 121205, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ
СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ
ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1, ПОМ 334, РАБ М 45
Фактический адрес: Обособленное подразделение ООО «СИКМО»
142712, Московская область, Ленинский городской округ, Горки
Ленинские п, Каширское шоссе, квартал «Пронино», влад. 1, стр. 1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СИКМО»



Загузов М.А.
«13» июня 2023 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК (С АРОМАТАМИ БАУНТИ, ЛАНДЫША, БАРБАРИСА, МАНДАРИНА)

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель отдела исследований
ООО «СИКМО»

Гольдберг А.А.

ООО «СИКМО» (Российская Федерация)
ГОСТ 31696-2012

Москва 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предназначена для применения при осуществлении гигиенической обработки кожных покровов рук с использованием средства PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК.

1.2. Инструкция определяет методы применения жидкого средства PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК, требования техники безопасности, алгоритм санитарной обработки кожных покровов рук.

2. Описание и состав

2.1. Жидкое мыло PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК предназначено для гигиенической обработки кожных покровов рук. Благодаря специальным компонентам в составе не сушит, а увлажняет кожу рук.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.13422/22 от 05.10.2022 Евразийского экономического союза.

2.2. Средство представляет собой перламутровую жидкость с цветом применяемого красителя и с запахом применяемой отдушки (баунти, барбарис, ландыш, мандарин), pH концентрата 5,5-6,5 ед., плотность концентрата 1,00-1,05 г/см³, хорошо растворим в воде.

2.3. Состав препарата.

- INCI: Water (Aqua), Sodium Laureth Sulfate, Lauryl/Myristyl Betaine, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Glycerin, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Fragrance, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, [+/- CI 14720, CI 15985, CI 74180, CI 45100].
- Состав: вода, лауретсульфат натрия, лаурил/миристилбетаин, хлорид натрия, кокамид ДЭА, глицерин, дистеарат гликоля, кокамид МЭА, лаурет-10, ароматизатор, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, красители [+/- CI 14720, CI 15985, CI 74180, CI 45100].

2.4. Срок годности препарата – 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

2.5. При соблюдении условий хранения средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Является негорючей жидкостью, биоразлагаемо.

2.6. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство при нанесении на кожу, введению в желудок и ингаляционному воздействию относится к IV классу (малоопасные соединения). Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и sensibilizing свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.

3. Применение средства PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК

3.1. Гигиеническая обработка рук: Снимите ювелирные украшения. 2-3 мл средства нанести на влажные кисти рук, запястья;

3.2. Обрабатывать ладони, обратную сторону ладоней, между пальцами, ногти, подушечки пальцев, большие пальцы в течение 1 минуты;

3.3. Смыть проточной водой.

3.4. После обработки руки высушить бумажным полотенцем, протирочным материалом или в автоматическом осушителе для рук.

4. Меры предосторожности

4.1. При работе с моющим средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях.

4.2. Храните в недоступных для детей местах и вдали от продуктов питания. Только для наружного применения.

4.3. Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде. Не допускать попадания концентрата в окружающую среду.

4.4. Запрещается смешивать с другими моющими средствами.

5. Меры первой медицинской помощи

5.1. При попадании средства в глаза необходимо их тщательно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дать теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.