

ЗАВОД СИКМО

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

PLEX®

Общество с ограниченной ответственностью «СИКМО»
ИНН 5003088980, КПП 773101001, ОГРН 1105003006217, ОКПО 68156989
Телефон: 8 (495) 477-44-03, e-mail: info@sikmo.ru, www.plexs.ru
Юридический адрес: 121205, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ
СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ,
ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1, ПОМ 334, РАБ М 45
Фактический адрес: Обособленное подразделение ООО «СИКМО»
142712, Московская область, Ленинский городской округ, Горки
Ленинские п, Каширское шоссе, квартал «Пронино», влад. 1, стр. 1.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СИКМО»

Загузов М.А.
«13» июня 2023 г.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Жидкого мыла

PLEX МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ РУК С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель отдела исследований
ООО «СИКМО»



Гольдберг А.А.

ООО «СИКМО» (Российская Федерация)
ГОСТ 31696-2012

Москва 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предназначена при осуществлении гигиенической обработки рук и кожных покровов работников с использованием жидкого мыла PLEX МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ РУК С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ.

1.2. Инструкция определяет методы применения жидкого мыла PLEX МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ РУК С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ, требования техники безопасности, алгоритм санитарной обработки рук, кожных покровов.

2. Описание и состав

2.1. Средство PLEX МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ РУК С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ предназначено для гигиенической обработки рук и кожных покровов. Бережно очищает кожу рук, даря ощущение глубокого увлажнения и мягкости. Витамин Е помогает бороться со свободными радикалами и сохранить коже молодость, упругость и эластичность.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.13422/22 от 05.10.2022 Евразийского экономического союза.

2.2. Средство представляет собой прозрачную жидкость с цветом применяемого красителя и с запахом применяемой отдушки, pH концентрата 5,5-6,5 ед., плотность концентрата 1,00-1,10 г/см³, полностью растворим в воде.

2.3. Состав препарата.

- INCI: Water (Aqua), Lauryl/Myristyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Caprylyl/Decyl Glucoside, Fragrance, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Tocopheryl Acetate, CI 14720.
- Состав: вода, лаурил/миристил бетаин, ПЭГ-7 глицерилкокоат, глицерин, каприлил/децилглюказид, ароматизатор, лимонная кислота, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, токоферилацетат, краситель CI 14720.

2.4. Срок годности препарата – 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

2.5. При соблюдении условий хранения средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Является негорючей жидкостью, биоразлагаемо.

2.6. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство при нанесении на кожу, введению в желудок и ингаляционному воздействию относится к IV классу (малоопасные соединения). Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.

3. Применение средства PLEX МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ РУК С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ

3.1. Гигиеническая обработка рук: Снимите ювелирные украшения. 2-3 мл средства нанести на влажные кисти рук, запястья;

3.2. Обрабатывать ладони, обратную сторону ладоней, между пальцами, ногти, подушечки пальцев, большие пальцы в течение 1 минуты;

3.3. Смыть проточной водой.

3.4. После обработки руки высушить бумажным полотенцем, протирочным материалом или в автоматическом осушителе для рук.

4. Меры предосторожности

- 4.1. При работе с моющим средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях.
- 4.2. Храните в недоступных для детей местах и вдали от продуктов питания. Только для наружного применения.
- 4.3. Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде. Не допускать попадания концентрата в окружающую среду.
- 4.4. Запрещается смешивать с другими моющими средствами.

5. Меры первой медицинской помощи

- 5.1. При попадании средства в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- 5.2. При попадании средства в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу.
- 5.3. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дать теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.